

患者信息
TYRVAYA™ (Teer-vye-ah)
(varenicline solution)
鼻腔喷剂，用于鼻内使用

什么是 TYRVAYA？

TYRVAYA 是一种处方鼻腔喷剂，用于治疗干眼症的病征与症状。

在使用 TYRVAYA 之前，请先告知您的医疗保健提供者您所有的医疗状况，包括您是否：

- 怀孕或计划怀孕。目前尚不清楚 TYRVAYA 是否会伤害您的胎儿。
- 正在进行母乳喂养，或计划母乳喂养。目前尚不清楚 TYRVAYA 是否会渗入您的乳汁。您与您的医疗保健提供者应决定，如果您计划进行母乳喂养，您是否可以使用 TYRVAYA。

告知您的医疗保健提供者所有您正在服用的药物，包括处方药和非处方药、维生素和草本补充剂。

知道您服用的药物。请保留一份药物清单，以便您在取得新药物时出示给您的医疗保健提供者和药剂师。

我该如何使用 TYRVAYA？

- 关于 TYRVAYA 的正确使用方法，请参阅本患者信息单末尾的使用说明。
- TYRVAYA 在喷入鼻腔后会增加眼睛的泪液分泌。
- 请严格按照您医疗保健提供者的指示使用 TYRVAYA。
- 请勿摇晃瓶身。
- 在各鼻孔中喷 1 次 TYRVAYA，一日 2 次（大约间隔 12 小时）。
- 1 个月用量的 TYRVAYA 由 2 瓶鼻腔喷剂组成。请先用完一瓶，然后再打开第二瓶。TYRVAYA 为玻璃瓶装，附有白色鼻腔泵和蓝色防尘罩。
- 若您错过一次 TYRVAYA 剂量，请跳过该剂量，并在常规预定时间喷用您的下一次剂量。请勿为了弥补错过的剂量而过量用药。

TYRVAYA 可能产生哪些副作用？

最常见的 TYRVAYA 副作用包括打喷嚏、咳嗽，以及喉咙和鼻子的刺激。

以上并不是 TYRVAYA 所有可能产生的副作用。请致电您的医生咨询副作用。

您可以致电 1-800-FDA-1088 向 FDA 报告副作用。

我该如何存放 TYRVAYA？

- 将 TYRVAYA 存放在 68°F 至 77°F (20°C 至 25°C) 的室温中。
- 请勿冷冻。
- 在第一次使用 TYRVAYA 鼻腔喷剂瓶 30 天后扔掉（丢弃）。

请将 TYRVAYA 和所有药物放置在儿童无法触及之处。

关于安全和有效使用 TYRVAYA 的一般信息。

药物有时会被用于患者信息单中所列以外的用途。请勿将 TYRVAYA 用于治疗未开处方的病症。请勿将 TYRVAYA 交给他人使用，即使其症状与您相同。这可能会对他人造成伤害。您可以向您的药剂师或医疗保健提供者询问关于专门为保健专业人士编写的 TYRVAYA 信息。

TYRVAYA 有哪些成分？

活性成分：酒石酸伐尼克兰

非活性成分：磷酸二铵七水合物、无水磷酸一钠、氯化钠、氢氧化钠和/或盐酸（用于调节 pH 值）以及注射用水。

TYRVAYA™是 Oyster Point Pharma, Inc.的商标。

TYRVAYA™和/或 TYRVAYA™在某一方法中的使用可能由一项或多项专利或专利申请所涵盖，详情可在 www.oysterpointrx.com/patent-notices 查阅。

为以下公司制造：Oyster Point Pharma, Inc., 202 Carnegie Center, Suite 109, Princeton, NJ 08540